



Gitzi Enthornung Tierklinik Nesslau

Bei der Enthornung von Gitzi gibt es einige wichtige Punkte zu beachten um einerseits eine dauerhafte Enthornung zu gewährleisten und andererseits das Narkoserisiko für diese jungen Tiere zu minimieren.

Grundsätzlich

- Nur gesunde Tiere enthornen
- Gitzi werden nur in der Klinik enthornt

Zeitpunkt

- Böckli mit 1 Woche: da männliche Tiere ein sehr starkes Hornwachstum zeigen, ist es nötig, die Enthornung sehr früh durchzuführen
- Weibliche Tiere mit 10-14 Tagen: Die schützenden Antikörper aus der Biestmilch fallen 3 Wochen nach Geburt ab, daher ist ein zwei Wochen altes Gitzi i.d.R. stärker in der Abwehr als ein 3 Wochen altes Gitzi

Vorbereitung

- Die Gitzi sollten kurz gefastet sein vor der Narkose
- Gitzi, welche anfangs Nachmittag enthornt werden, sollten die letzte Tränke am frühen Morgen erhalten

Überwachung/Pflege nach dem Enthornen

- Gitzi sollten bis zum vollständigen Erwachen an einem warmen Ort gehalten werden und in Sternallage verbracht werden
- Die ersten 24 Stunden nach dem Enthornen gut auf Nachblutungen achten und diese falls nötig stillen
- Sollte ein Nachwachsen der Hörner beobachtet werden, bitte möglichst rasch einen Termin zur Nachenthornung abmachen. Je früher diese durchgeführt wird, umso grösser ist die Chance auf eine nachhaltige Enthornung.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.